

**Rp:**

- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**  
APLICAR UNA GOTA SUSPENSIÓN EN OJO DERECHO CADA 2 HORAS DURANTE 3 DIAS
- **T&B (MOXIFLOXACINO) GOTAS 5 ML (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN OJO DERECHO CADA 8 HORAS DURANTE 5 DIAS
- **AQUADRAN GEL 50 MG (Dexpantenol) (GEL OCULAR 10 GR)**  
APLICAR EN OJO DERECHO DENTRO DEL OJO, CADA 12 HORAS HASTA TERMINAR
- **COMBIGAN D (Brimonidina/Timolol) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN OJO DERECHO CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **LAGRICEL PF MULTIDOSIS (Hialuronato) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 3 HORAS NO SUSPENDER

**Recomendaciones:**

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta:      3 SEMANAS

Fecha de cita: \_\_\_\_\_

Próxima cita: Dr(a) \_\_\_\_\_

Agendó: \_\_\_\_\_

Médico

**ILSE LOPEZ OSORIO**